Gemeinschaftspraxis Hibbe
Kirchstraße 14
48308 Senden-Ottmarsbocholt

Gelbfieberimpfung

Aufklärung zur Impfung

Was ist Gelbfieber und warum sollte ich mich impfen lassen

Gelbfieber ist eine akut lebensbedrohende Infektionskrankheit, welche bei ungünstigem Verlauf tödlich endet. Übertragen wird sie durch Mücken. Erreger ist das Gelbfiebervirus. Es kommt in bestimmten tropischen Regionen in Südamerika und Afrika vor, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Gelbfieberverbreitungszonen deklariert wurden. In Gebieten mit Vorkommen von Gelbfieber ist eine Übertragung in ländlichen aber auch in städtischen Regionen möglich. Zu Ihrem persönlichen Schutz ist es notwendig, sich spätestens 10 Tage vor Einreise in diese Gebiete gegen Gelbfieber impfen zu lassen. Daneben verlangen viele Länder die Vorlage einer international gültigen Bescheinigung (Impfpass) über eine Gelbfieberimpfung, wenn Sie aus einem der Länder mit Gelbfieberinfektionsgebieten einreisen wollen.

So verläuft eine Gelbfieberimpfung

Die gut wirksame und im Allgemeinen gut verträgliche Gelbfieberimpfung erfolgt mit einem sogenannten Lebendvirusimpfstoff, d. h. abgeschwächte Gelbfieber-Impfstoffviren werden unter die Haut des Oberarmes gespritzt. Während der ersten 2 bis 7 Tage nach der Impfung kommt es zu einer Vermehrung der Impfviren. Dadurch wird Ihr Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen (Antikörpern) angeregt. 10 Tage nach der Impfung verfügen Sie über einen wirksamen Impfschutz gegen die Gelbfiebererkrankung, der bei immungesunden Erwachsenen lebenslang anhält. Bei bestimmten Personengruppen (z. B. Kindern unter 2 Jahren, Schwangeren, Immungeschwächten) ist eine Auffrischimpfung nach 10 Jahren erforderlich.

Mögliche Reaktionen nach der Impfung

Bei 20-25 % der Geimpften kommt es innerhalb von 1-3 Tagen nach der Impfung, selten länger anhaltend, zu einer Lokalreaktion an der Impfstelle mit einer geringen Rötung, Schwellung oder zu leichten Schmerzen, teilweise mit Beteiligung der zugehörigen Lymphknoten und zu Kopfschmerzen. Bei bis zu 10 % kommt es innerhalb von 4-7 Tagen nach der Impfung zu grippeähnlichen Symptomen wie leichtem Fieber, Abgeschlagenheit, Gelenk- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, gelegentlich auch Bauchschmerzen. In der Regel klingen diese Impfreaktionen rasch und folgenlos wieder ab und machen keine ärztliche Behandlung erforderlich.

Sehr selten beobachtete Reaktionen

Bei Allergien speziell gegen Hühnereiweiß oder andere Bestandteile des Impfstoffes können Minuten bis Stunden nach der Impfung allgemeine Überempfindlichkeitsreaktionen wie Nesselsucht, Schleimhautschwellungen im Rachen mit Luftnot und eventuell Schockzustände auftreten. Allergische Spätreaktionen mit unterschiedlichen Hauterscheinungen oder Schmerzen in Muskeln und Gelenken sowie noch seltener Verminderung der Blutplättchen (Thrombozyten) mit Blutungsneigung können bei Impflingen mit besonderer Allergieneigung bis zu zwei Wochen nach der Impfung auftreten. Sehr selten kam es nach der Erstimpfung zu einer Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute oder einer schweren gelbfieberartigen Erkrankung anderer Organe. Insgesamt sind weltweit ca. 30 Fälle mit schweren Nebenwirkungen und 17 Todesfälle bei über 400 Millionen Geimpften aufgetreten. In Deutschland sind bisher keine Todesfälle berichtet worden.

Textvorlage: Gemeinschaftspraxis Hornberger / Riediger / Schmalen, modifiziert nach DTG

Gemeinschaftspraxis Hibbe
Kirchstraße 14
48308 Senden-Ottmarsbocholt

Risiken und Verhalten

Bitte lesen Sie auch diese Hinweise vor dem Ausfüllen des Fragebogens.

Besondere Risiken

Da das Risiko für schwere Nebenwirkungen bei älteren Personen erhöht zu sein scheint, sollten - laut Gebrauchsinformation des Gelbfieberimpfstoff-Herstellers zu STAMARIL® - Erstimpfungen bei Personen über 60 Jahre nur durchgeführt werden, wenn ein hohes und unvermeidbares Risiko einer Gelbfieber-Infektion vorliegt. Gehören Sie zu dieser Gruppe, besprechen Sie das weitere Vorgehen mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt. Da bei einigen geimpften Personen mit schweren Nebenwirkungen organische oder funktionelle Thymuserkrankungen vorlagen, sollte dies als zusätzliches Risiko für schwere Nebenwirkungen berücksichtigt werden.

Wann sollte eine Impfung nicht durchgeführt werden

Eine Impfung sollte nicht durchgeführt werden bei akuten oder chronischen Infektionen, Erkrankungen des Nervensystems, schweren Lebererkrankungen, Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Hühnereiweiß oder Impfstoffbestandteile, Erkrankung des körpereigenen Abwehrsystems (u. a. symptomatische HIV-Infektion oder HIV-Infektion mit einer Zahl von unter 200 Helferzellen/mm^3), immunsuppressiver Behandlung (z. B. systemischer Cortisonbehandlung mit Tabletten oder Spritzen oder anderen Immunsuppressiva), Strahlen- und Chemotherapie, gegenwärtiger Behandlung von Allergien durch Desensibilisierung, Zustand nach Thymusdrüsenentfernung oder -fehlfunktion und nicht bei Säuglingen unter 9 Monaten. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte die Impfung nur unter strenger Nutzen-Risiko-Abwägung und nur bei einem unvermeidbaren Infektionsrisiko verabreicht werden.

Andere Impfungen und Kontaktpersonen

Weitere Lebendimpfungen wie Mumps, Masern, Röteln und Windpocken können nur gleichzeitig oder im zeitlichen Abstand von 4 Wochen vor bzw. nach der Gelbfieberimpfung gegeben werden. Andere Impfungen und auch die Gabe eines Immunglobulinpräparates (Antikörperpräparat z. B. zur Hepatitisvorbeugung) müssen der Impfärztin / dem Impfarzt mitgeteilt werden. Die Impfviren werden nicht auf Kontaktpersonen übertragen; die Impfung ist also für andere Familienangehörige ungefährlich, z. B. für eine in der Umgebung lebende Schwangere oder kleine Kinder. Falls einer der hier genannten Umstände auf Sie zutrifft oder Sie sich unsicher sind, ob Sie eine Gelbfieberimpfung erhalten dürfen, teilen Sie Ihre Zweifel der Impfärztin / dem Impfarzt mit.

Verhalten nach der Impfung

Für die Dauer von 1 Woche nach der Impfung sollten Sie sich keinen starken körperlichen Anstrengungen aussetzen (Leistungssport, Operationen, Sauna) und Sonnenbäder sowie übermäßigen Alkoholgenuss vermeiden. Für 4 Wochen nach der Impfung dürfen Sie kein Blut spenden. Für die Dauer von 4 Wochen nach der Impfung ist eine Schwangerschaft zu vermeiden. Eine Impfung in der Schwangerschaft oder eine Schwangerschaft nach der Impfung ist aber kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Während der Stillzeit sollte nicht geimpft werden. Sollten in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung Symptome auftreten, die Sie auf die Impfung zurückführen, konsultieren Sie eine Ärztin / einen Arzt.

Textvorlage: Gemeinschaftspraxis Hornberger / Riediger / Schmalen, modifiziert nach DTG

Gemeinschaftspraxis Hibbe
Kirchstraße 14
48308 Senden-Ottmarsbocholt

Fragebogen und Erklärung

Bitte alle Fragen beantworten. Die hellen Felder sind digital ausfüllbar; pro Frage ist eine Antwort wählbar.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Zur Abschätzung des Risikos möglicher Nebenwirkungen und zum Ausschluss von Gegenanzeigen

	Ja	Nein
1. Leiden Sie an akuten oder chronischen Infektionen?	☐	☐
2. Haben Sie in letzter Zeit körperliche Veränderungen oder Störungen Ihres Allgemeinbefindens bemerkt; hatten Sie in den letzten Tagen Fieber?	☐	☐
Wenn ja: was / welche und wann?		
3. Leiden Sie an Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen?	☐	☐
4. Leiden Sie an Erkrankungen des Nervensystems?	☐	☐
5. Ist bei Ihnen die Thymusdrüse entfernt oder eine Thymuserkrankung bekannt?	☐	☐
6. Ist oder war bei Ihnen eine Überempfindlichkeit (Allergie) oder Asthma bekannt?	☐	☐
7. Ist bei Ihnen eine spezielle Überempfindlichkeit gegen Hühnereiweiß bekannt?	☐	☐
8. Ist Ihre körpereigene Abwehr (Immunsystem) durch eine Krankheit (z. B. innere Erkrankung, HIV/AIDS) oder bestimmte Behandlungen (Chemotherapie, Desensibilisierung, Cortisontherapie, Strahlentherapie) beeinträchtigt?	☐	☐
Wenn ja: bitte erläutern		
9. Nehmen Sie Medikamente ein?	☐	☐
Wenn ja: welche Medikamente?		
10. Wurden Sie während der letzten 4 Wochen geimpft?	☐	☐
Wenn ja: wogegen?		
11. Sind Sie zuckerkrank (Diabetiker)?	☐	☐
12. Nur für Frauen: Sind Sie schwanger / stillen Sie?	☐	☐
13. Sind Sie bereits früher einmal gegen Gelbfieber geimpft worden?	☐	☐
14. Für über 60-Jährige: Die Reise ist aus privaten / dienstlichen Gründen unvermeidbar.	☐	☐

In welches Land / welche Länder wollen Sie verreisen?

Erklärung zur Aufklärung

Über die Notwendigkeit der Impfung und ihre möglichen Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen wurde ich umfassend informiert. Ich habe dieses Merkblatt sowie den medizinischen Fragebogen vollständig gelesen, verstanden und zutreffend beantwortet, hatte die Möglichkeit, alle mich interessierenden Fragen mit der Ärztin / dem Arzt zu besprechen, und habe keine weiteren Fragen mehr.

Erklärung bestätigt ☐ Ja ☐ Nein

Datum der Aufklärung und Impfung

Chargennummer / Chargensticker

Unterschrift Ärztin / Arzt

Unterschrift Patientin / Patient

Textvorlage: Gemeinschaftspraxis Hornberger / Riediger / Schmalen, modifiziert nach DTG